



## ¿Cuáles son algunos de los síntomas de la parálisis cerebral?

Los síntomas de la parálisis cerebral varían considerablemente ya que existen muchos tipos y niveles diferentes. El primer síntoma de que su hijo tiene parálisis cerebral es un retraso en alcanzar los indicadores importantes en el área motora o del movimiento. Si observa alguno de estos síntomas, llame al doctor o enfermera de su hijo.

### Un niño de más de 2 meses con parálisis cerebral puede:

- Tener dificultad para controlar la cabeza cuando es levantado.
- Tener piernas rígidas que se cruzan como tijeras cuando es levantado.

### Un niño de más de 6 meses con parálisis cerebral puede:

- Seguir teniendo dificultad para controlar la cabeza cuando es levantado.
- Tratar de alcanzar las cosas con una sola mano mientras que la otra permanece empuñada.

### Un niño de más de 10 meses con parálisis cerebral puede:

- Gatear empujándose con una pierna y un brazo mientras que arrastra la pierna y el brazo opuestos.
- Ser incapaz de sentarse por sí solo.

### Un niño de más de 12 meses con parálisis cerebral puede:

- No gatear.
- Ser incapaz de pararse con apoyo.

### Un niño de más de 24 meses con parálisis cerebral puede:

- No caminar.
- Ser incapaz de empujar juguetes con ruedas.